



## Noyade

Présentation typique : Insuffisance respiratoire aigue résultant de la submersion ou de l'immersion en milieu liquide

Stade I ou aquastress : pas d'inhalation, angoisse, hyperventilation, tachycardie, tremblements

**Stade II ou petite noyade** : encombrement bronchopulmonaire, cyanose, hypothermie, agitation

**Stade III ou grande noyade** : DRA, obnubilation ou coma

**Stade IV ou anoxie** : ACR, coma aréactif

### PIEGES :

Si ACR, poursuivre RCP tant que  $T < 32\text{ °C}$  (objectif 33 – 35 °C)

### Signes de gravité :

- DRA
- OAP sans et avec hypoTA
- coma
- ACR

### Recherche étiologique :

Malaise ?

Accident ?

### Prise en charge immédiate

### Symptomatique Thérapeutique étiologique

- 1- Ventilation : si conscient : MHC, si signes de DRA : VNI, si inconscient : IOT SR
- 2- OAP : VNI
- 3- hypoTA : remplissage prudent, amines
- 4- SNG avec vidange, VVP NaCl 0.9 %, réchauffement / séchage (couverture isotherme)
- 5- ACR : RCP

Extraction du milieu liquide en position horizontale (collapsus d'extraction)  
Respect axe tête – cou – tronc (collier cervical systématique)

### Orientation

Réanimation : troubles de la conscience et / ou troubles ventilatoires

Hospitalisation : inhalation sans troubles ventilatoires

Aucun trouble, pas d'inhalation : retour à domicile

### Message clé :

Collier cervical

Troubles ventilatoires : VNI

Troubles de la conscience : IOT