

Angioœdème (visage ; voies aériennes supérieures)

SOS CREAK : 06 74 97 36 88

Ne pas prescrire
d'acide tranexamique

AE d'origine indéterminée :
Lévocétirizine : 4 cp PO
Ou **Dexchlorphéniramine (polaramine^R)** : 2 amp en IVL

AE bradykinique **CONNU**:
Héréditaire (avec ou sans déficit en C1Inh)
ou Acquis par déficit en C1Inh

Absence d'amélioration
Appel SOS CREAK

Prise d'**IEC, Entresto^R, ou ARAII** actuelle
ou dans le mois précédent
Contexte de **thrombolyse récente (<6h)**

Injection le plus rapidement possible
en 1^{ère} intention
FIRAZYR 30 mg SC
Ruconest 50 UI/kg en IVL

BERINERT ou CINRYZE 20 UI/kg en IVL
Si femme enceinte ou enfant < 2 ans.

NON

OUI

Refaire 2 amp de **Polaramine^R**

Injection le plus rapidement possible
de
FIRAZYR 30 mg SC
Ruconest 50 UI/kg en IVL

Si signe de gravité
Adrénaline IM:
0,01 mg/kg (max 0,5mg)
Auto-injecteur : 150 µg (<25kg)
300 µg (>25kg)

Appel SOS CREAK

Appel SOS CREAK

Appel SOS CREAK

Arrêt définitif : IEC ou ARAII
Switcher vers un autre traitement
Consultation CREAK