



PRISE EN CHARGE DE LA GRIPPE AUX URGENCES

Rappel des recommandations SPILF-COREB 2016

ISOLEMENT RESPIRATOIRE

Patients + Soignants : masque chirurgical (FFP2 si geste exposant les voies aériennes)

RECHERCHE DE **COMPLICATIONS** et/ou **SIGNES DE GRAVITE**

Complications respiratoires

Foyer de pneumopathie
Décompensation respiratoire
Bronchite associée

Signes de gravité

Défaillance **respiratoire** (Dyspnée, polypnée >25/min, cyanose, SpO₂ <94% aa)
Défaillance **HDN** (PAS<90, FC>120)
Défaillance **neurologique**, confusion
Oligurie, anurie

IDENTIFICATION DES **POPULATIONS A RISQUE**

Personnes âgées de > 65 ans

Femmes enceintes

Déficit immunitaire inné ou acquis (ttt antirejet, **patient greffé...**)

Maladies **respiratoires** chroniques, insuffisance respiratoire

Cardiopathies chroniques, insuffisance cardiaque

Affections **neurologiques** chroniques

Insuffisance rénale aiguë ou **néphropathie** chronique

Drépanocytose, Diabète, Affections hépatiques chroniques

Patient institutionnalisés

CRITERES D'HOSPITALISATION

Critères de « bon sens »

Patient appartenant à une **population à risque**

Présence de **signes de gravité**

Terrain, comorbidité, contexte social

Risque de complications, nécessité d'une surveillance

TRAITEMENT CURATIF

TRAITEMENT PAR ANTIVIRAUX - dans les 48h après le début des symptômes

Réduit la durée des symptômes, l'excrétion du virus et la transmission
Réduit le risque de complications, formes graves

Oseltamivir (TAMIFLU) – per os (comprimés ou susp. Buvable)

> 40kgs : **75mg x 2 / jour, traitement de 5 jours**

< 40kgs : posologie à adapter au poids

Si insuffisance rénale :

Clairance de la créatinine	Dose recommandée pour le traitement
>30 (ml/min)	75 mg deux fois par jour
>10 à ≤30 (ml/min)	75 mg une fois par jour ou 30 mg de suspension deux fois par jour
≤10 (ml/min)	Non recommandé
Patients dialysés	Non recommandé

Population cible :

Tableau **grave d'emblée** ou grippe compliquée d'aggravation rapide

Population à risque (cf. tableau), notamment en cas d'immunodépression

Tableau compliqué nécessitant une hospitalisation

Nb : Traitement préventif de 75mg 1x/jour pendant 7 jours, pour les personnes à très haut risque de complications, notamment si institutionnalisées, et ayant été en contact étroit avec un patient grippé (même lieu de vie, contact direct à moins d'1 mètre lors de toux, discussion, éternuement)