

Réaction cutanéomuqueuse  
+  
Atteinte respiratoire  
Ou  
Hypotension artérielle

≥ 2 signes parmi  
Réaction cutanéomuqueuse  
Et/ou  
Atteinte respiratoire  
Et/ou  
Hypotension artérielle  
Et/ou  
Signes gastro-intestinaux persistants

Adrénaline 0,01 mg/kg (max 0,5mg)  
IM

Si inefficace

Adrénaline 0,01 mg/kg (max 0,5mg)  
IM

Si inefficace

Adrénaline 0,05 à 0,1 µg/kg/min  
IVSE  
+ appel du réanimateur

Mesures associées :

- Remplissage si défaillance HD
- Si atteinte VAS : **aérosol adrénaline**
- Si atteinte VAI : **aérosols bêta 2 mimétiques**
- **Corticothérapie** 1mg/kg
- **Antihistaminiques**

TRYPTASE : dosage entre 30 min à 2h après le contact

Surveillance

- 6 heures si atteinte cutanéomuqueuse isolée
- 12 à 24 heures si adrénaline faite

A la sortie :

Trousse de secours : stylo auto injecteur d'adrénaline, ventoline, corticoïdes, anti-histaminiques, consignes écrites  
Consultation allergologique (bon à faxer)