


## Définition de la migraine sans aura :

- A.** Au moins cinq crises répondant aux critères B à D
- B.** Crises de céphalées durant de 4 à 72 heures (sans traitement)
- C.** Céphalées ayant au moins deux des caractéristiques suivantes :
  - unilatérale
  - pulsatile
  - modérée ou sévère
  - aggravation par les activités physiques de routine, telles que montée ou descente d'escaliers
- D.** Durant les céphalées au moins l'un des caractères suivants :
  - nausée et/ou vomissement
  - photophobie et phonophobie
- E.** L'examen clinique doit être normal entre les crises.

## Définition de la migraine avec aura :

- A.** Au moins cinq crises répondant aux critères B et C
- B.** Aura consistant en au moins 1 des caractères suivants (sans déficit moteur) :
  - symptôme visuel réversible (positif ou négatif)
  - symptôme sensitif réversible (positif ou négatif)
  - trouble phasique réversible
- C.** Au moins deux des caractères suivants :
  - symptôme visuel homonyme ou sensitif unilatéraux
  - développement progressif sur au moins 5 minutes ou plus et/ou apparitions successives des symptômes
  - durée inférieure à 60 minutes
- D.** L'examen clinique doit être normal entre les crises.  
L'aura peut être isolée ou suivie d'une céphalée



## Indications à l'imagerie :

- En urgence, TDM ou IRM devant toute migraine apparue après 50 ans et/ou forme atypique et/ou anomalie de l'examen clinique
- Sans urgence, une IRM avec angioIRM artérioveineuse si non faite jusqu'à présent
- Pas d'indication à une imagerie devant une migraine avec ou sans aura définie par les critères ci-dessus